

téma: Sekce geriatrie - Pooperační delirium u geriatrických pacientů - doporučení pro praxi

sekce: Lékařská sekce

forma prezentace: ústní prezentace

vlo.il: MUDr. Katarína Bielaková

Pooperační delirium u geriatrických pacientů - doporučení pro praxi

autoři: Katarína Bielaková¹

¹ FN Brno Bohunice

Populace seniorů nad 65 let patří mezi nejrychleji rostoucí složku populace. Vzhledem k tomuto demografickému vývoji je nárůst potřeby chirurgických zákroků u této části pacientů. Delirium charakterizujeme jako akutní pokles kognitivních funkcí a pozornosti a představuje akutní selhávání mozku. Pooperační delirium je považováno za nejčastější chirurgickou komplikaci u geriatrických pacientů, přičemž se vyskytuje u 5-50% pacientů po operaci. Delirium řadíme mezi vážné komplikace, nakolik epizoda deliria může iniciovat kaskádu nežádoucích efektů, s negativním dopadem na délku hospitalizace, ztrátu soběstačnosti, snížení kognitivních funkcí s možným následkem smrti.

Povzbudivá je informace, že až u 40 % pacientů můžeme deliriu předcházet, takže správnou intervencí mu můžeme účinně předcházet.

Diagnostika a léčba deliria s vytvořením plánu péče o geriatrického pacienta jsou nezbytnou součástí optimální péče o geriatrického pacienta.

Účelem sdělení bude informovat lékaře, jak správně pečovat o tyto pacienty s pooperačním deliriem v klinické praxi